

INSTRUKCJA UŻYWANIA



NaCl 3%

hipertoniczny roztwór do inhalacji



HIPERTONICZNY, STERYLNY 3% ROZTWÓR CHLORKU SODU

Nie do wstrzykiwania

Wskazania:

Pobudza usuwanie wydzieliny w dolnym odcinku dróg oddechowych poprzez działanie osmotyczne, np. w przypadku mukowiscydozy, rozszerzenia oskrzeli, zapalenia oskrzelików.

Zapobieganie wysychaniu śluzu oskrzelowego.

Hipertoniczny 3% roztwór soli do inhalacji może być stosowany z nebulizatorami pneumatycznymi lub ultradźwiękowymi.

HIPERTONICZNY, STERYLNY ROZTWÓR CHLORKU SODU 3% może być stosowany u niemowląt, dzieci oraz dorosłych.

Postać oraz zawartość opakowania:

Opakowanie zawiera 30 ampułek jednodawkowych o pojemności 4 ml.

Skład:

Chlorek sodu: 3 g

Woda oczyszczona: q.s. 100 ml

Nie zawiera konserwantów.

Sposób użycia:

Zalecana dawka hipertonicznego 3% roztworu soli do inhalacji to jedna jednodawkowa ampułka 2 do 4 razy dziennie.

Należy oderwać ampułkę i otworzyć ją odkręcając górną część. Wlać roztwór do inhalacji do nebulizatora. Nebulizatora należy używać zgodnie z instrukcją producenta dołączoną do urządzenia.

Skutki uboczne:

W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowe podrażnienie (np. kaszel) lub odwracalne zwężenie oskrzeli. Zaleca się wstępne leczenie lekami rozszerzającymi oskrzela. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.






Środki ostrożności przy stosowaniu:

- Wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Wyłącznie do inhalacji.
- Nie do wstrzykiwania.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy ampułka nie jest uszkodzona. Nie należy używać uszkodzonej ampułki.
- Nebulizatora należy używać zgodnie z instrukcją producenta dołączonej do urządzenia.
- W przypadku skłonności do występowania duszności lub nadwrażliwości, roztworu do inhalacji nie należy stosować bez nadzoru lekarza.
- Nie łączyć z innymi lekami.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Otwartych ampułek nie należy ponownie używać: ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących, ponowne użycie prowadziłoby do ryzyka podania zanieczyszczonego roztworu.

Apteczka ABC NaCl 3% hipertoniczny roztwór do inhalacji jest wyrobem medycznym klasy IIa.

Data nadania znaku CE: 11/12/2013
Wersja instrukcji używania: 12/2013

 Laboratoire UNITHER
151, Rue André Durouchez
Espace Industriel Nord
CS 28028
80084 Amiens Cedex 2
FRANCJA

Dystrybutor: Gofarm Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Górników 21/26, 30-819 Kraków, Polska
www.gofarm.pl

Wyprodukowano dla: Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
www.silesianpharma.pl
Wyprodukowano we Francji
ABCH/IU/03/2023



4854/01/H

65NOT3004/A